

*Llame su departamento de salud local si tiene preguntas tocante el TB, o si alguien en su hogar a sido expenido al TB.*

**TB**

*Tratamiento  
para infección  
de la  
tuberculosis  
latente*



DOH Pub 343-003 5/2000

Para personas con discapacidades, este documento está disponible en otros formatos. Para ordenar estos documentos, llame al 1-800-525-0127.


## ¿QUÉ ES UNA INFECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS LATENTE?

*Se produce una infección de TB latente cuando se tiene el germen de esta enfermedad en el cuerpo, pero no está causando ningún mal y no es contagioso.*

En la mayoría de los casos, el modo en que se determina esto es por medio de una prueba de la tuberculosis en la piel. Al cabo de dos o tres días, si la zona de la prueba de la piel presenta endurecimiento, eso significa que se infectó con el germen de la tuberculosis en algún tiempo del pasado. Entonces se le examina el pecho con rayos X para asegurarse de que no haya signos de tuberculosis activa en los pulmones. Si los rayos X del pecho son normales, el estado se denomina infección de TB latente. Latente quiere decir que el germen se encuentra presente, pero dormido.

*Si no estoy enfermo, ¿por qué tengo que tomar medicamentos para la infección de el TB latente?*

Si no recibe tratamiento, hay probabilidades de que la infección de TB latente se desencadene más tarde y provoque una TB activa, por lo común en los pulmones. Esto podrá hacer que se enferme gravemente y difundir el mal entre otras personas que le rodeen. La TB activa es difícil de curar y requiere por lo menos seis meses de un tratamiento más complejo. El tomar las pastillas en la actualidad durante **todo el periodo de tratamiento** hace que se reduzcan las probabilidades de contraer la TB activa.



## TRATAMIENTO DE UNA INFECCIÓN DE TB LATENTE

### *¿Cuánto tiempo se necesita para tratar una infección de TB latente?*

Dependiendo del medicamento que le administre su doctor o su enfermera, pueden requerirse de dos a nueve meses para tratar el TB latente. Se necesita todo ese tiempo porque el medicamento mata muy lentamente los gérmenes del TB, por lo que tiene que permanecer en su interior durante mucho tiempo para asegurarse de que todos los gérmenes se mueran. Es importante que se tomen las pastillas durante todo el periodo que se lo recomiende su doctor o enfermera, aun cuando no se sienta enfermo(a). Si deja de tomarlas antes del final del tratamiento completo, las probabilidades de cura serán mucho más bajas.

### *¿Cuáles son los efectos secundarios?*

Hay medicamentos muy seguros, sobre todo cuando los pacientes hablen con sus doctores o enfermeras sobre cualquier cosa desacostumbrada que sientan mientras estén tomando las pastillas. Algunas personas experimentan dolores de cabeza o trastornos estomacales que se presentan durante cierto tiempo después de tomar las pastillas, principalmente durante las primeras semanas de tratamiento. Esos síntomas no son peligrosos, mejoran con el tiempo y no son una razón para abandonar el tratamiento a menos que sean de índole grave. Haga que


su doctor o enfermera tengan conocimiento de ellos y podrán proporcionarle consejos sobre cómo puede sentirse mejor mientras esté tomando las pastillas.

Los efectos más graves son raros, pero se deberán poner inmediatamente en conocimiento de su doctor o enfermera. Dichos efectos incluyen:

- pérdida del apetito
- náuseas
- dolores hepáticos (del hígado)
- amarillamiento del blanco de los ojos
- obscurecimiento de la orina (de color té)
- fiebre durante más de tres días
- magulladuras fáciles o encías sangrantes
- sarpullido de la piel
- dolores en las coyunturas.

Si tiene cualquiera de dichos síntomas, llame a su doctor o enfermera antes de seguir tomando el medicamento. En la mayoría de los casos, su doctor tendrá que examinarle y hacerle unos cuantos análisis de sangre para ver si todo ello se debe a las pastillas contra el TB.

*Marque su calendario cada día cuando tome sus pastillas*



## **MI HIJO(A) TIENE QUE TOMAR PASTILLAS TAMBIÉN CONTRA EL TB**

*¿Cómo afectará esto a mi hijo(a)?*


Aun cuando no esté enfermo(a), su hijo(a) deberá tomar pastillas contra el TB para prevenir la enfermedad. Estos medicamentos son todavía más seguros para los niños que para los adultos. Su pequeño(a) podrá jugar con otros, ir a la escuela o la guardería infantil y realizar otras actividades exactamente igual que antes. Recuerde que las dosis para niños(as) son con frecuencia menores que las de los adultos — asegúrese de mantener las pastillas de su hijo(a) separadas de las suyas. Póngase en contacto con su doctor o su enfermera si tiene dificultades para que su hijo(a) tome el medicamento o si considera que las pastillas están causando algún problema.

## **ANALGÉSICOS**

No utilice Tylenol contra el dolor o la fiebre, mientras esté tomando pastillas contra el TB. En lugar de ello, use Advil.

Tylenol combinado con las pastillas contra el TB puede ser muy dañino para el hígado.

*Tome sus pastillas  
todos los días  
a la misma hora*



**MODOS PARA  
RECORDAR  
CUANDO DEBE  
TOMAR SU  
PASTILLAS**

- Tome sus pastillas todos los días a la misma hora.
- Marque su calendario cada día cuando tome sus pastillas.
- Antes de acostarse, prepare las pastillas para el día siguiente. Asegurando que no estén al alcance de los niños.

